

2020



**Il coordinamento tecnico
frutticolo Agrion**

Luca Nari

Agrion
Agricoltura ricerca innovazione

Martedì 25 febbraio 2020

AVVISO BIO N° 3

POMACEE

Melo

Cancri rameali: monitorare le previsioni meteo

Autonomo del melo: epoca per intervenire

Psille vettrici degli scopazzi: monitoraggio volo

Pero

Cacopsylla pyri: presenza adulti

DRUPACEE

Pesco

Bolla del pesco: fase sensibile (monitorare le previsioni meteo)

Afide verde: presenza delle fondatrici

Anarsia lineatella: larve svernanti

Susino

Afide verde: presenza delle fondatrici

Albicocco

Fioritura in corso: tutelare le api!

Ciliegio


Corineo/Batteriosi: difesa preventiva



DIFESA DELLE POMACEE

MELO

Fase fenologica attuale: rottura gemme



Antonomo del melo

Valgono le indicazioni riportate nell'aggiornamento tecnico N 2.

Cancri rameali

Valutare con attenzione le previsioni meteo del fine settimana e in caso di pioggia programmare preventivamente l'intervento **rameico** d'inizio stagione contro i cancri rameali.

Psille vettrici degli scopazzi

Nelle zone a maggior rischio seguire con attenzione il volo dell'insetto e programmare, nel caso si verificano delle catture significative, l'intervento con le **piretrine**.

PERO

Fase fenologica attuale: rottura gemme


Cacopsylla pyri

Valgono le indicazioni riportate nell'aggiornamento tecnico N 2.

DIFESA DELLE DRUPACEE

PESCO

Fase fenologica: calice visibile/bottoni rosa



Bolla del pesco

Monitorare attentamente le previsioni meteo che prevedono un cedimento dell'alta pressione per il fine settimana con l'arrivo di possibili piogge. Se tale previsione sarà confermata intervenire con **polisolfuro di calcio** in preventivo (distanziare debitamente da interventi con oli minerali).

Afide verde

Intervenire in prefioritura (bottoni rosa) sulle fondatrici con prodotti a base di **piretro**.

Anarsia lineatella

Nei pescheti a rischio intervenire prima della fioritura sulle larve svernanti con il **Bacillus thuringensis**.



SUSINO

Fase fenologica: bottoni fiorali separati



Afide verde

Valgono le considerazioni fatte per il pesco.

ALBICOCCO

Fase fenologica: fioritura in corso




Si ricorda che nel periodo florale è **VIETATO** intervenire con insetticidi/acaricidi e erbicidi al fine di **TUTELARE GLI INSETTI PRONUBI**. Inoltre, per l'eventuale esecuzione di fungicidi contro la **Monilia** è necessaria la concessione della deroga da parte del Settore Fitosanitario regionale.

Monilia

Valgono le indicazioni riportate nell'aggiornamento tecnico N 2.

CILIEGIO

Fase fenologica attuale: bottoni rosa



Corineo/Batteriosi

Monitorare le previsioni meteo intervenendo in previsione di una pioggia con un **prodotto rameico**.