



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
20/05/2020

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA MOLESTA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE: DAI MONITORAGGI IN CAMPO NON RISULTA PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE L'INIZIO DELLA NUOVA GENERAZIONE E LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI

SUSINO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

MELO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE I QUESTI GIORNI SONO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON FOSSE RIUSCITO AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE (ENTRO VENERDÌ 15 MAGGIO) SI CONSIGLIA DI UNIRE AL PRODOTTO DI COPERTURA PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL*, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO*, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

* PER MICLOBUTANIL E TEBUCONAZOLO MASSIMO 2 INTERVENTI

AFIDE GRIGIO

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

FOSMET*(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

