



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 06**  
**03/06/2020**

**PESCO**  
**(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

### **CYDIA MOLESTA**

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE DI RIPRESA DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 1 INT.) T.C. 7 GG**

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)**  
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

### **OIDIO**

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

**BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG**

OPPURE

**ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C. 5 GG**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**

\*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)

IN CASO DI INFEZIONI IN ATTO SI CONSIGLIA DI ASPORTARE I GETTI COLPITI





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

**FOSMET (SPADA)** (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

**ACETAMIPRID (KESTREL)** (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON, )** (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

**SPINOSAD (LASER)** (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO CHE SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA PRIMA GENERAZIONE: SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE).

### AFIDI

VISTA LA FASE FENOLOGICA, IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA COMUNQUE DI CONTATTARE I TECNICI PER INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK)** AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

**SULFOXAFLOR (CLOSER)** AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI)** AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

---

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA.

## CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE PREVISIONI DI PIOGGIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX\*** (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

**FOSMET\*** (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

**ACETAMIPRID\*** (EPIK) T.C. 14 GG

\* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

