



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 07
17/06/2020

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE DALLA PROSSIMA SETTIMANA PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG
INDOXACARB (STEWARD) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG
FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG
THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG
SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG
ETOFENPROX(TREBON, SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7GG
BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)**
- **TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)**
- **DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)**
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**
- **BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**
- **PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)**
- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)**
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

ETOFENPROX (TREBON,) (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

NON SI SEGNALANO NOVITÀ PARTICOLARI PER CUI SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

CILIEGIO-ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

VISTE LE PREVISIONI DI PIOGGIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (MATURAZIONE)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

FOSMET* (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SPINETORAM (DELEGATE)(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)T.C. 7 GG

ACETAMIPRID (EPIK) T.C. 14 GG

CYANTRANILIPROLE* (EXIREL) T.C 14 GG)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA REGIONALE DEL 08/06/2020*

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

CAPNODIS TENEBRIONIS

SI SEGNA LA PRESENZA DI TALE COLEOTTERO CHE PROVOCA DANNI ALLE DRUPACEE IN FASE LARVALE (SULLE RADICI DELLE PIANTE) ED IN FASE DI ADULTO (DEFOGLIAZIONE): IN CASI RICONDUCIBILI ALLA PRESENZA DELL'INSETTO SULLA COLTURA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

