



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 09
01/07/2020

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA):

VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - **TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
 - **DIFENOCONAZOLO** (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - **BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - **PENTHIOPYRAD** (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
 - **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
- (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
- FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
- (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SIAMO NELLA FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: SI CONSIGLIA DI TRATTARE A PARTIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.
ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG
ETOFENPROX (TREBON,) (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.
SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

NON SI SEGNALANO NOVITÀ PARTICOLARI PER CUI SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)
BUPIRIMATE (NIMROD)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO ED IN PREVISIONE DI BAGNATURE FOGLIARI.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

