


Info n. 16

Del 01/07/2020

NOCCIÒLO



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE

CAMPIONAMENTO CIMICI: I RILIEVI IN CAMPO

Le previsioni a breve termine indicano l'arrivo di una massa d'aria di origine afromediterranea con caldo estivo almeno fino alla giornata di giovedì anche se, in alcune zone per via di un fronte instabile già nella giornata di mercoledì, si attiveranno temporali a partire dalle ore pomeridiane. Un secondo fronte, associato all'ingresso di aria più fredda, favorirà un netto calo delle temperature rispetto ad inizio settimana anche se l'evento avrà carattere temporaneo.

In tabella il riepilogo della piovosità e delle temperature (T max, T min e T media) di alcune stazioni indicative delle aree corilicole piemontesi nell'ultima settimana per i mesi di maggio-giugno 2020

STAZIONE	T MAX °C		T MIN °C		T MEDIA °C		PIOGGIA TOT (mm)	
	MAGGIO	GIUGNO	MAGGIO	GIUGNO	MAGGIO	GIUGNO	MAGGIO	GIUGNO
CRAVANZANA	21,7	23,8	10,1	11,8	15,4	17,4	115,8	50,6
GABIANO	25,9	28,3	14	15,6	19,5	21,6	79,6	69,2
MONCALVO	24,8	27,8	12,7	14,1	18,3	20,4	75,4	151,2
PINEROLO	25,8	28,2	12,8	14,3	18,9	20,9	173,6	90,2
VIVERONE	25,1	27,6	13,2	14,7	18,6	20,4	132,4	196,6

Tab 1- Pioggia e Temperature °C (Media, Max, Min) di alcune stazioni in areali corilicoli

(Fonte: Servizio Agrometeorologico- Regione Piemonte)

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE

Nel dettaglio immagini la situazione fenologica

ACCRESIMENTO SEME



La situazione è variabile a seconda della fascia altimetrica e dell'esposizione del nocciolo, ma in generale siamo nella fase di ACCRESIMENTO MANDORLA (fase 1-2) H-G (Fenogramma nocciolo –Corilicoltura sostenibile in Piemonte 2020).

CAMPIONAMENTO CIMICI: I RILIEVI IN CAMPO

Rispetto alla settimana scorsa, la situazione si è evoluta in modo differenziato a seconda delle zone e si può così riassumere:

- **Alessandrino, Albese, Biellese, Canavese, Cuneese, Monregalese, Saluzzese, Torinese** le catture rimangono al di sotto della soglia e pertanto **proseguono i frappege anche la prossima settimana.**
- **Astigiano, Valle Bormida e Valle Belbo-Tinella**: il campionamento eseguito questa settimana ha evidenziato presenza di adulti e forme giovanili oltre la soglia. Per queste zone si consiglia di:

Effettuare il 1° trattamento insetticida, compatibilmente con le condizioni meteo, entro fine di questa settimana. Si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a ettaro dei singoli prodotti e bagnare con adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/ha).

I principi attivi autorizzati contro le cimici sono:

AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
CIMICE ASIATICA	DELTAMETRINA	DECIS EVO	35 - 40	0,4 - 0,5	30	Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno. ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di utilizzo di piretroidi
	ETOFENPROX	TREBON UP	50	0,5 - 0,75	14	
	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5 ecc	170	1,7	7	
	ACETAMIPRID*	EPIK SL*	100-150	2	14	Al massimo 1 trattamento. La società consiglia di impiegarlo in presenza di forme giovanili

*Deroga territoriale (n. 7.60.100, 4/2020A) alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo del prodotto commerciale Epik SL, contenente la s.a. acetamiprid, dal 14.05.2020 al 10.09.2020, contro la cimice asiatica su nocciolo.