




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 04
05/05/2021

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO TRAMITE CONTROLLO VISIVO E TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA PRIMA GENERAZIONE.

IN SITUAZIONI STORICAMENTE A RISCHIO PER ATTACCHI PRECOCI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

INDOXACARB (STEWARD) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG
FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

SUSINO (ACCRESIMENTO FRUTTI)

I DATI DEL MONITORAGGIO TRAMITE CONTROLLO VISIVO E TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA PRIMA GENERAZIONE.

SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO QUESTA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

IN **ALTERNATIVA** SI CONSIGLIA DI TRATTARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG





Coldiretti Alessandria



MELO (FINE FIORITURA) TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE (INIZIO PROSSIMA SETTIMANA) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

CAPTANO (VARI)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIP. DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL*, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO*, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

* PER MICLOBUTANIL E TEBUCONAZOLO MASSIMO 2 INTERVENTI

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo indicativo. L'applicazione dei vari prodotti deve rispettare quanto stabilito dall'etichetta ministeriale e, se aderenti all'operazione 10.11, ai DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

