

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 07.06.2021

Fase fenologica prevalente: **Pre-fioritura**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le condizioni meteorologiche e la delicatezza della fase fenologica, indicano la necessità di un intervento preventivo con prodotti a base di **Rame** da effettuarsi non appena possibile.

L'attuale disposizione sull'utilizzo del rame in agricoltura biologica, impone un utilizzo massimo su vite di Rame metallo di 28 kg/ha complessivi nei 7 anni che vanno dal 2019 al 2025. Decade pertanto la limitazione sull'apporto annuale massimo di rame di 6 kg di sostanza attiva per ettaro e per anno ma rimane la regola che, se si eccederà in certe annate nell'utilizzo del Rame, se ne dovrà fare a meno nelle annate successive. Si raccomanda a tal fine di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. Il limite massimo dei 28 kg/ha è quindi ripartibile sulle 7 annate. È necessario quindi preferire prodotti con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

È possibile, in alternativa, far seguire al trattamento antiperonosporico un intervento a base di **Zolfo in Polvere**.

INDUTTORI DI RESISTENZA

Coloro che avessero intrapreso strategie di difesa che includono l'utilizzo di induttori di resistenza devono proseguire nella loro distribuzione secondo le modalità e le dosi previste dalle etichette.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617